

2. domáca úloha z predmetu 1-AIN-121 Diskrétna matematika (1) ZS 2025/26

Ján Komara

19. októbra 2025

Pokyny

Príklady vypracujte podrobne. Píšte tak, aby človek, ktorý bude vašu úlohu kontrolovať, mohol ľahko sledovať vaše argumenty a tiež sled vašich myšlienok (skúste sa vžiť do jeho situácie). Výsledok bez zdôvodnenia nestačí. Za výsledok bez postupu (hoci správny) nebudete môcť dostať plný počet bodov. Neodpisujte riešenia iných. Napíšte len to, čomu naozaj rozumiete a čomu veríte. Cieľom týchto úloh je totiž sa niečo naučiť a precvičiť si to. Zjavne odpísané úlohy dostanú 0 bodov. Nad príkladmi nemusíte samozrejme rozmýšľať v tom poradí, v akom sú zadané. Odovzdať ich napísané v tomto poradí ale musíte (aby sa vo vašom riešení dalo vyznať). Viditeľne označte začiatok každého príkladu. Ak riešenie niektorého príkladu neodovzdávate, napíšte aj tak jeho číslo a vynechajte trochu miesta. Používajte notáciu a terminológiu, ktorú sme zaviedli na prednáške a cvičeniach. Úlohu môžete konzultovať s vašim cvičiacim alebo navštívte akademické podporné centrum.

Odovzdať:

v MOODLE do pondelka 27. októbra.

Úlohu musíte odovzdať ako *pdf súbor*. Riešenie treba vypracovať v nejakom editore (napr. LaTeX, LibreOffice, MS Word). Oskenovaný rukopis neposielajte, ten nebudeme hodnotiť.

Úloha je za 8 bodov.

1. príklad

Spočítajte, koľko celočíselných riešení má nasledujúci systém nerovníc:

$$x_1 + x_3 + x_5 < 12, \quad (1)$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 < 20, \quad (2)$$

kde $1 \leq x_1$, $-2 \leq x_2 \leq 2$, $3 \leq x_3$, $-4 \leq x_4$, $5 \leq x_5$ a $-6 \leq x_6 \leq 6$.

2. príklad

Na premiérový 1. ročník vedomostnej súťaže *Všade dobre, na matfyzе najlepšie* sa prihlásilo n manželských párov. Koľkými spôsobmi môžeme z nich vytvoriť n súťažných dvojíc tak, aby žiaden manželský pár nesúťažil spolu.

Pokyny. Výsledok vyjadrite pomocou súčtovej notácie Σ .